

# Hipotiroidismo Canino

Terapia con  **Leventa®**

## Fase de Inicio:

Hormonas tiroideas*	Dosis de Leventa	
· T4 total baja · TSH alta	<b>20 µg/kg</b> (0,2 ml/10 kg peso)	Una vez al día

\*Una T4 total baja junto a una TSH alta puede sugerir hipotiroidismo.

## Ajuste de la dosis:

T4 total después de 4 semanas.

Ajuste de la dosis si es necesario, en base a la respuesta clínica al tratamiento y a la concentración de T4 total, 4 - 6 horas post tratamiento.

## Fase de mantenimiento:

Peso (Kg)	Dosis (µg/kg)			
	10	20	30	40
	Volumen de producto (ml)			
5	0,05	0,10	0,15	0,20
10	0,10	0,20	0,30	0,40
15	0,15	0,30	0,45	0,60
20	0,20	0,40	0,60	0,80
25	0,25	0,50	0,75	1,00
30	0,30	0,60	0,90	1,20
35	0,35	0,70	1,05	1,40
40	0,40	0,80	1,20	1,60
45	0,45	0,90	1,35	1,80
50	0,50	1,00	1,50	2,00

Leventa deberá ser administrado a la misma hora todos los días.



**UNI-  
ENDO**  
EXPERTOS EN  
ENDOCRINOLOGÍA  
MSD Animal Health

**MSD**  
Animal Health